

PRÍLOHA č. 4

MIERA FUNKČNEJ PORUCHY PODĽA DRUHOV ZDRAVOTNÝCH POSTIHNUTÍ

Druh zdravotného postihnutia - Miera funkčnej poruchy v %

I. Infekčné a parazitárne choroby

1. Tuberkulóza
 - 1.1. dýchacích ústrojov
 - a) počas aktivity ochorenia.... 40
 - b) počas aktivity ochorenia s funkčným obmedzením stredného až ťažkého stupňa s komplikáciami 50-70
 - 1.2. iných orgánov a systémov
 - a) počas aktivity ochorenia.... 40
 - b) počas aktivity ochorenia s funkčným obmedzením stredného až ťažkého stupňa s komplikáciami.... 50-70
2. Infekčné a parazitárne choroby s následkami
 - 2.1. ľahké poruchy funkcie niektorých orgánov a systémov, 10-20
 - 2.2. stredne ťažké formy s recidívou alebo trvale aktívne so znížením výkonnosti funkcie orgánu.... 30-40
 - 2.3. ťažké formy liečbou neovplyvniteľné, chronické stavy s ťažkou poruchou funkcie orgánu a s ťažkým obmedzením výkonnosti50-70
3. AIDS
 - 3.1. zistenie HIV-infekcie bez klinických príznakov.... 0
 - 3.2. syndróm lymfadenopatie
 - a) ľahká alterácia celkového stavu30
 - b) stredne ťažká alterácia celkového stavu a výkonnosti50-60
 - c) ťažká alterácia celkového stavu (rozvinutie choroby, terminálna fáza, ťažké infekčné komplikácie) ...80-100

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa funkčného postihnutia chorého orgánu a celkového stavu organizmu.

II. Choroby krvi, krvotvorných orgánov a poruchy imunitných mechanizmov

1. Málokrvnosť, nedostatok hemoglobínu (zhubná, hemolytická, panmyelopatia a pod.)
 - a) mierne prejavy.... 0-10
 - b) stredne ťažké prejavy.... 20-40
 - c) ťažké prejavy (s trvalou potrebou transfúzie a imunosupresívnej liečby s obmedzením výkonnosti).... 50-80
2. Poruchy zrážanlivosti a iné stavy krvácania
 - a) ľahká forma.... 10-20
 - b) stredne ťažká forma (s občasným krvácaním do kĺbov).... 30-50
 - c) ťažká forma (s častým krvácaním do kĺbov so sekundárnymi artrotickými zmenami)70-90
3. Strata sleziny
 - a) u detí do 15 rokov (bez krvného ochorenia).... 20
 - b) u dospelých10
4. Chronická lymfatická leukémia (lymfadenóza) a ostatné typy non-Hodgkinovho lymfómu
 - a) s ľahkými prejavmi (bez známk progresie)20-30
 - b) so stredne ťažkými prejavmi
 - ba) do troch rokov liečby50
 - bb) po troch rokoch liečby.... 30-40
 - c) s ťažkými prejavmi (ťažká anémia, trombocytopénia a pod.)80-100
5. Plazmocytóm (myelóm)
 - a) s ľahkými prejavmi (bez známk progresie)20-30
 - b) so stredne ťažkými prejavmi30-50
 - c) s ťažkými prejavmi (málokrvnosť, poruchy funkcie obličiek, osteolýza, bolesti)80-100
6. Hodgkinov lymfóm (lymfogranulóm)
 - a) štádium I. - III.A
 - aa) počas dlhodobej liečby (viac ako šesť mesiacov) do skončenia liečby.... 50-70
 - ab) v plnej remisii (po troch rokoch)40
 - b) štádium III.B - IV.
 - ba) do skončenia liečby70-80
 - bb) v plnej remisii (po troch rokoch)....50
7. Chronická myeloidná leukémia (myelóza)
 - a) chronická fáza v liečbe, s prejavmi na celkový stav.... 40-60
 - b) akútne zhoršenie70-100
8. Chronické myeloproliferačné ochorenia ostatné (polycytémia vera, esenciálna trombocytopénia, osteomyeloskleróza a pod.)
 - a) ľahká forma.... 20-30
 - b) stredne ťažká forma30-40
 - c) ťažká forma.... 80-100
9. Akútne leukémia a difúzne non-Hodgkinov lymfóm (tiež v remisii).... 80-100
 - a) u detí až do skončenia liečby.... 100
 - b) pri prípadnej remisii trvajúcej päť rokov50-60

10. Ostatné chronické krvné choroby

- a) bez zjavných prejavov10
- b) s miernymi prejavmi.... 20-40
- c) s ťažkými prejavmi.... 50-80

11. Niektoré poruchy mechanizmu imunity

- a) ťažké imunodeficity s rozsiahlymi a opakovanými infekčnými komplikáciami, rezistentné na liečbu a vyvolávajúce ťažké obmedzenie výkonnosti50-80
- b) typ protilátkový, bunkový, fagocytárny a komplementárny20-40

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa závažnosti hematologických zmien, pôsobenia na iné orgány a na celkový zdravotný stav.

III. Endokrinné poruchy, poruchy výživy a premeny látok

1. Poruchy funkcie štítnej žľazy

1.1. hyperfunkcia

- a) ľahký stupeň (vegetatívne prejavy)0-10
- b) stredný stupeň (s pretrvávajúcou tachykardiou, značná strata na hmotnosti a pod.)20-30
- c) ťažký stupeň (výrazné schudnutie, tyreotoxické srdce, psychické a očné poruchy).... 40-50

1.2. hypofunkcia nedostatočne kompenzovaná liečbou.... 20-30

2. Zhubný nádor štítnej žľazy

- a) včasné odstránenie v štádiu T1-2 NOMO30-50
- b) v priebehu onkologickej liečby alebo neliečiteľné formy80-100
- c) po stabilizácii (do piatich rokov)20-40

3. Stav po strumektómii pre nezhubné ochorenie uspokojivo kompenzované liečbou0-10

4. Tetanický syndróm ťažkého stupňa (výskyt častých závažných záchvatov)20

5. Chronická nedostatočnosť kôry nadobličiek (Addisonova choroba)

- a) dobre kompenzovaná liečbou20
- b) stredne ťažká forma (začínajúca adynamia, chudnutie, zníženie výkonnosti)30-40
- c) ťažká forma (s výraznou adynamiou, chudnutím, s opakovanými krízami a podstatným znížením výkonnosti)50-70

6. Zvýšená funkcia kôry nadobličiek (Cushingov syndróm, Connov syndróm, adrenogenitálny syndróm)

- a) s komplikáciami na rôznych orgánových systémoch, prejavy svalovej slabosti20-30
- b) iatrogénny Cushingov syndróm10

7. Nádory nadobličiek vrátane stavov po odstránení nádorov

- a) v priebehu onkologického liečenia alebo neliečiteľné formy.... 80-100
- b) po stabilizácii zdravotného stavu (po dvoch rokoch)40

8. Poruchy hypotalamo-hypofyzárneho systému

- a) dobre kompenzované liečbou20
- b) závažné prejavy na ostatných orgánoch s obmedzením výkonnosti40-50

9. Nádory podmozgovej žľazy

- a) v priebehu onkologického liečenia.... 80
- b) po stabilizácii (po dvoch rokoch) podľa ovplyvnenia celkového stavu40

10. Cukrovka

- a) kompenzovateľná perorálnou liečbou a diétou alebo kompenzovateľná inzulínom a diétou bez komplikácií30-50
- b) ťažko kompenzovateľná inzulínom alebo cukrovka detského veku50-60
- c) chronické komplikácie cukrovky (diabetická angiopatia, neuropatia, diabetická noha)60-70

11. Fenyلكetonúria

- a) u detí bez prejavov poškodenia mozgu do 18. roku veku50
- b) u dospelých bez prejavov poškodenia mozgu počas trvania liečby diétou.... 30-50

12. Mukoviscidóza (cystická fibróza)

- a) bez komplikácií.... 20-30
- b) s pľúcnymi prejavmi, črevnými prejavmi mierneho stupňa (telesný vývoj zodpovedá veku) 30-50
- c) s pľúcnymi prejavmi, črevnými prejavmi so zníženou telesnou výkonnosťou....40-60
- d) s pľúcnymi prejavmi, črevnými prejavmi ťažkého stupňa s výrazne oneskoreným telesným vývojom60-90

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa závažnosti vlastnej choroby s prihliadnutím na sekundárne zmeny, komplikácie (odchýlky laboratórnych hodnôt od normy sa nehodnotia).

Miera funkčnej poruchy pri poruchách metabolizmu tukov, dne a alimentárnej tučnosti sa určí podľa závažnosti komplikácií jednotlivých orgánových systémov.

IV. Duševné poruchy a poruchy správania

1. Poruchy psychického vývoja detí

- a) ľahké formy10-20
- b) stredne ťažké formy30-40
- c) ťažké formy50-80
- d) zvláštne psychické poruchy a pervazívne vývinové poruchy (napr. autizmus)60-100

2. Poruchy osobnosti a správania u dospelých
 - a) mierne narušenie sociálnej prispôsobivosti.... 20
 - b) ťažké narušenie sociálnej prispôsobivosti50

3. Mentálna retardácia
 - a) ľahká mentálna retardácia IQ.... 50-69
 1. horné pásmo.... 20-30
 2. stredné pásmo.... 30-40
 3. dolné pásmo.... 40-50
 - b) stredná mentálna retardácia IQ 35-49.... 50-60
 - c) ťažká mentálna retardácia IQ 20-34.... 80-90
 - d) hlboká mentálna retardácia IQ pod 20.... 100
 - e) geneticky podmienená mentálna retardácia s multiorgánovým postihnutím podľa klinického stavu (napr. Morbus Down) 50-100

4. Afektívne poruchy nálady (manické, depresívne, periodické)
 - a) ľahké formy20
 - b) stredne ťažké formy.... 30
 - c) ťažké formy60

5. Neurotické stresové a somatoformné poruchy
 - a) ľahké formy10
 - b) stredne ťažké formy.... 20-40
 - c) ťažké formy (obsedantné neurózy) 50-60

6. Schizofrénia, schizotypové poruchy, poruchy s bludmi a halucináciami
 - a) ľahké formy....20
 - b) stredne ťažké formy.... 50-60
 - c) ťažké formy.... 90

7. Alkoholizmus
 - a) alkoholizmus I. a II. fáza.... 0-10
 - b) alkoholizmus III. a IV. fáza.... 40-50

8. Duševné poruchy a poruchy správania spôsobené psychoaktívnymi látkami
 - a) ľahká forma.... 0-10
 - b) stredne ťažká forma (do dvoch rokov od začiatku postihnutia) 30
 - c) ťažká forma60-70

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa rozsahu zdravotného postihnutia, výskytu atakov, psychiatrického a psychologického nálezu, podľa narušenia sociálneho života, narušenia orientácie, intelektu, pamäti, myslenia, správania, emotivity, afektivity a pri úplnom rozpade osobnosti s trvalým dozorom sociability sa určia maximálne hodnoty miery funkčnej poruchy.

V. Nervový systém (Poškodenie mozgu a miechy)

1. Cievne ochorenia mozgu, vnútroľbovú výdutina, stavy po vnútroľbovom krvácaní, ložiskovej nedokrvenosti mozgu
 - a) ľahká forma20
 - b) stredne ťažká forma40-60
 - c) ťažká forma.... 70-90

2. Zápalové ochorenia mozgu, neurodegeneratívne ochorenia, polyradikuloneuritídy, polyneuropatia a detská obrna
 - a) ľahká forma.... 20-30
 - b) stredne ťažká forma40-60
 - c) ťažká forma.... 70-90

3. Roztrúsená mozgovomiechová skleróza
 - a) ľahká forma (s monoparézou, očné príznaky) - Kurtzkého škála 1-220-40
 - b) stredne ťažká forma - Kurtzkého škála do 440-60
 - c) ťažká forma (triparéza a kvadruparéza) - Kurtzkého škála nad 4.... 70-100

4. Epilepsia
 - a) veľmi zriedkavé veľké záchvaty s pauzami dlhšími ako jeden rok, malé záchvaty s pauzami mesiacov.... 20
 - b) zriedkavé veľké záchvaty s pauzami mesiacov, malé záchvaty s pauzami týždňov30-40
 - c) stredne časté veľké záchvaty s pauzami týždňov, malé záchvaty s pauzami dní.... 40-50
 - d) časté veľké záchvaty týždenne alebo séria generalizovaných záchvatov, alebo malé záchvaty denne50-60

5. Narkolepsia, hypersomnia
 - a) ojedinelé záchvaty10
 - b) stredne časté záchvaty20
 - c) veľmi časté záchvaty s obmedzením výkonnosti.... 30

6. Migréna
 - a) ľahká forma.... 0
 - b) stredne ťažká forma10
 - c) ťažká forma so silne vyjadrenými sprievodnými prejavmi spravidla jedenkrát týždenne.... 20

7. Neuralgia trojklaného nervu
 - a) ľahká forma.... 10
 - b) stredne ťažká forma.... 20
 - c) ťažká forma so silnou bolesťou.... 40-60

(pri neúspešnej konzervatívnej liečbe)

8. Periférna obrna lícneho nervu

- a) jednostranná, úplná obrna20-30
- b) obojstranná kompletná obrna so závažnými trvalými komplikáciami40-60

9. Parkinsonova choroba

- a) ľahká forma (ojedinelé mimovoľné pohyby)20
- b) stredne ťažká forma40-60
- c) ťažká forma (tremor, rigidita, bradykinéza) 60-80

10. Centrálna vegetatívne poruchy (závraty, poruchy spánku, vazomotorické poruchy, úporné bolesti hlavy)

- a) ľahká forma.... 10
- b) stredne ťažká forma (s ojedinělými synkopami) 20
- c) poruchy s častejšími záchvatmi a s dôsledkami na celkový stav.... 30

11. Koordinačné poruchy a poruchy rovnováhy

- a) ľahká forma.... 10-20
- b) stredne ťažká forma (postihnutie oboch končatín) 40-60
- c) ťažká forma (s nemožnosťou samostatného pohybu) 80-90

12. Poruchy osobnosti, správania, intelektu a komunikácie následkom dysfunkcie mozgu (napr. demencie rôzneho typu a etiológie, organický psychosyndróm)

- a) ľahká forma20
- b) stredne ťažká forma40-60
- c) ťažká forma80-100

13. Čiastočné a úplné mozgové obrny (pyramídového a extrapyramídového pôvodu)

- a) monoplégia50
- b) hemiplégia80
- c) paraplégia90
- d) kvadruplégia.... 100
- e) monoparéza10-30
- f) hemiparéza20-60
- g) paraparéza20-60
- h) kvadruparéza.... 40-80
- i) ľahká paréza reziduálna10-20
(hodnotí sa dominantnosť horných končatín)

14. Nádory lebkovej dutiny a miechového kanála

- a) stav po operácii, počas onkologického liečenia do piatich rokov.... 80
- b) po stabilizácii s miernym reziduálnym nálezom40
- c) neliečiteľné formy so stredne ťažkým postihnutím90
- d) neliečiteľné formy s ťažkým postihnutím100

15. Poškodenie miechy

- a) monoplégia50
- b) hemiplégia80
- c) paraplégia90
- d) kvadruplégia.... 100
- e) monoparéza10-30
- f) hemiparéza40-50
- g) paraparéza.... 50-60
- h) kvadruparéza.... 60-80
- i) akroparéza, reziduálna ľahká paréza10-20
- j) poruchy vyprázdňovania močového mechúra a konečníka ako následok poškodenia chrbtice a miechy
 - 1. ľahká forma30-60
 - 2. ťažká forma (úplna inkontinencia)100

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa poruchy funkcie, výpadových javov, výskytu záchvatov, dĺžky trvania záchvatov a výskytu vegetatívnych porúch, neurologického nálezu, psychiatrického nálezu, psychologického nálezu a komplikácií.

Miera funkčnej poruchy pri poškodení miechy sa určí podľa funkčných porúch na končatinách, porúch inervácie močového mechúra a konečníka s prihliadnutím na dominantnosť hornej končatiny.

VI. Zrak

- 1. Úplná slepota oboch očí90
- 2. Praktická slepota oboch očí (V 3/60 - 1/60) 80
- 3. Slabozrakosť (V 6/60 - 3/60)
 - a) deti a mladiství do skončenia školskej dochádzky.... 70
 - b) ostatné prípady50-60
- 4. Slabozrakosť (V 6/18 - 6/60)
 - a) deti do skončenia povinnej školskej dochádzky50-60
 - b) ostatné prípady40-60

5. Výpady zorného poľa (úplné, polovičné a kvadrantové)

Pri neúplných, polovičných alebo kvadrantových výpadoch je potrebné primerane znížiť percentuálne vyjadrenie miery funkčnej poruchy

- a) homonymná hemianopsia30-40
- b) bitemporálna hemianopsia30
- c) binasálna hemianopsia10
- d) homonymný horný kvadrant20
- e) homonymný dolný kvadrant30
- f) výpad zorného poľa (laterálne) pri strate alebo slepote druhého oka60-70

6. Koncentrické zúženie (obojsstranné zúženie zorného poľa na 10o až 5o centrálne je ťažká slabozrakosť, zúženie zorného poľa na 5o centrálne je praktická slepota aj pri zachovaní zrakovej ostrosti)

- a) koncentrické zúženie zorného poľa na 5o centrálne pri normálnom zornom poli druhého oka20
- b) obojsstranné zníženie na 30o od centra10-20

7. Koncentrické zúženie pri strate druhého oka

- a) na 50o od centra....40
- b) na 30o od centra60
- c) na 10o až 5o od centra.... 80-90

8. Nepravidelné výpady zorného poľa, veľké skotómy v 50o zorného poľa binokulárne30-40

9. Obrna očných svalov, ak oko musí byť vylúčené z videnia20

10. Diplopia10-20

11. Strabizmus u detí10-20

12. Strata jedného oka30

13. Strata šošovky bez poruchy zrakovej ostrosti

- a) jedného oka u dieťaťa do skončenia povinnej školskej dochádzky10-20
- b) oboch očí u dieťaťa do skončenia povinnej školskej dochádzky20-30
- c) ostatné prípady, jedného oka 10 oboch očí20

14. Strata šošovky jedného oka pri slepote alebo strate druhého oka

- a) u detí do skončenia povinnej školskej dochádzky.... 40-50
- b) ostatné prípady30-40

15. Odstránenie oka pre zhubný nádor

- a) počas onkologického liečenia100
- b) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov)40
- c) neliečiteľné formy100

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa miery zníženia zrakovej ostrosti s korekciou, rozsahu zorného poľa, hĺbkového videnia, okulomotoriky, slzenia, citlivosti na prach, na svetlo, ochorenia očných adnexov a adaptácie.

Miera funkčnej poruchy ptózy hornej mihalnice s úplným uzáverom očnej štrbiny, glaukómu (zelený zákal) a ostatných očných chorôb sa určí podľa stupňa zúženia zorného poľa, zrakovej ostrosti, schopnosti orientovať sa a psychického stavu.

VII. Sluch a poruchy ústroja rovnováhy

1. Vrodená obojsstranná praktická hluchota u detí alebo hluchota u detí, ktorá sa vyskytla pred rozvinutím reči, do skončenia prípravy na povolanie70-80

2. Získaná obojsstranná praktická hluchota alebo hluchota u detí, ktorá sa vyskytla až po rozvinutí reči, do 18. roku veku60-80

3. Obojsstranná praktická hluchota dospelých alebo hluchota dospelých60-70

4. Obojsstranná ťažká nedoslýchavosť u detí a dospelých zisťovaná slovnou alebo objektívnou audiometriou50-60

5. Obojsstranná stredne ťažká nedoslýchavosť u detí50

6. Obojsstranná stredne ťažká nedoslýchavosť u dospelých.... 30-40

7. Poruchy rovnováhy (objektívizovateľné poruchy vestibulárneho ústroja)

- a) ľahké závraty s hučaním v ušiach20-30
- b) stredne ťažké závraty (so značnou neistotou pri polohe stojmo a pri chôdzi)30-40
- c) ťažké závraty (so značnou neistotou pri polohe stojmo a pri chôdzi) alebo ťažký tinnitus.... 50-70

8. Komplikovaný chronický zápal stredného ucha20-30

9. Strata jednej ušnice10

10. Strata oboch ušníc30

11. Zhubné nádory (hltana, mandlí, hrtana, slinných žliaz a pod.)

- a) po odstránení nádoru pri onkologickej liečbe do piatich rokov40-80
- b) neliečiteľné formy zhubných nádorov90-100
- c) po stabilizácii zdravotného stavu40

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa miery zníženia sluchu, poruchy reči, následkom poškodenia sluchu, hučania v ušiach, bolesti v ušiach, poruchy rovnováhy, závratov, sociálnej adaptability a obmedzenia komunikačných schopností.

VIII. Srdce a obehové ústrojenstvo

A. Postihnutie srdca

1. Vrodené alebo získané srdcové chyby a postihnutie veľkých srdcových ciev, ischemická choroba srdca, stavy pri infarkte myokardu, chronické reumatické choroby srdca, stavy po operáciách, kardiomyopatie, stavy pri myokarditídach a pod.
 - a) bez podstatného zníženia výkonnosti žiadne prejavy nedostatočnosti ako dýchavičnosť, anginózne bolesti i pri obvyklom silnejšom telesnom zaťažení (napr. rýchla chôdza 7-8 km/hod., ťažká telesná práca, maximálna záťaž 100 W)0-10
 - b) stavy zodpovedajúce NYHA II
stupeň postihnutia zodpovedá poklesu výkonnosti pri stredne ťažkom zaťažení (napr. chôdza 5-6 km/hod., ťažkosti pri stredne ťažkej telesnej práci a rekreačných aktivitách, maximálna záťaž 75 W)20-40
 - c) stavy zodpovedajúce NYHA III
stupeň postihnutia zodpovedá podstatnému obmedzeniu bežnej fyzickej aktivity (napr. prechádzka 3-4 km/hod., stúpanie po schodoch na 1. poschodie, ľahká telesná práca, maximálna záťaž 50 W) 50-60
 - d) stavy zodpovedajúce NYHA IV
zjavné prejavy srdcového zlyhania v pokoji, dlhodobotrvajúce dekompenzácie, neschopnosť akejkoľvek fyzickej aktivity (max. 25 W) 70-90
2. Poruchy srdcového rytmu
 - a) bez hemodynamických účinkov alebo pri nepatrných subjektívnych ťažkostiach.... 0-10
 - b) s ľahkými hemodynamickými poruchami, liečbou kompenzované poruchy20-30
 - c) s ťažkými hemodynamickými poruchami (záťažová insuficiencia) alebo liečbou ťažko ovplyvniteľné poruchy.... 50-70
3. Stavy po operácii srdca, náhradách srdcových chlopní, operácii srdcových chýb, po resekcii aneurizmy, revaskularizačných výkonoch
 - a) s dobrým funkčným výsledkom20-30
 - b) pri závažnom znížení výkonu50-80
4. Implantácia kardiostimulátora20-30
5. Stavy po koronárnej angioplastike s dobrým efektom10-30
6. Chronické cor pulmonale miera funkčnej poruchy sa určí podľa porúch výkonnosti srdca a pľúc s prihliadnutím na stupeň hromadenia krvi v pľúcach a pľúcnej hypertenzie50-70
7. Transplantácia srdca do piatich rokov od transplantácie podľa funkcie a liečby.... 40-60

B. Postihnutie ciev

1. Arteriovenózne píšťaly
 - a) bez hemodynamického účinku alebo porúch periférneho prekrvenia0-10
 - b) s nepatrnými hemodynamickými vplyvmi alebo s poruchami periférneho prekrvenia20-30
 - c) s manifestnými prejavmi30-50
2. Aneurizmy (podľa polohy a veľkosti)
 - a) bez funkčnej poruchy, bez obmedzenia výkonnosti0-10
 - b) malé periférne výdute0-10
 - c) iné20-30
 - d) disekujúce aneurizmy aorty, veľké aneurizmy abdominálnej aorty a veľkých panvových tepien s obmedzením výkonnosti40-60
3. Tepnové uzáverové choroby - uzávěry tepien dolných končatín
 - a) štádium I. podľa Fontainea na jednej dolnej končatine alebo na oboch končatinách0-10
 - b) štádium II. podľa Fontainea s obmedzením kolaterálneho obehu, klaudikácie po 300 m až 500 m (Doppler na nohe 80-100 mm Hg)20-30
 - c) štádium III. podľa Fontainea klaudikácie po 50 m-300 m (Doppler na nohe 60-80 mm Hg)40-50
 - d) štádium IV. podľa Fontainea s bolesťami v pokoji a trofickými zmenami50-70
4. Kľčové žily
 - a) s nepatrným opuchom na končatine s minimálnymi trofickými zmenami na koži bez ťažkostí, jedna alebo obidve končatiny0-10
 - b) s výraznými ťažkosťami z hromadenia krvi v žilách, prítomnými recidívami zápalu - jedna alebo obidve končatiny10-20
 - c) s chronickými recidivujúcimi defektmi podľa rozsahu a výskytu na jednej alebo na oboch končatinách30-50
 - d) chronická venózna insuficiencia
 1. jedna dolná končatina30-40
 2. obidve dolné končatiny40-60
 - e) posttrombotický syndróm v oblasti panvy alebo dutých žíl - prichádza do úvahy vyššie hodnotenie
5. Lymfédém na jednej alebo na oboch končatinách
 - a) so zväčšením obvodu končatiny do 5 cm0-10
 - b) so zväčšením obvodu nad 5 cm, s obmedzením pohybu končatiny pre väčšiu hmotnosť a pre ovplyvnenie kĺbových funkcií20-30
 - c) pri neschopnosti používať postihnutú končatinu40-60
6. Poruchy krvného tlaku
 - a) 1. stupeň - mierna forma0-20
 - b) 2. stupeň - stredná forma20-30
 - c) 3. stupeň - ťažká forma40-60

7. Funkčné srdcovocievne syndrómy, ortostatická hypotónia
a) s ľahkými klinickými prejavmi0-10
b) s častými závratmi a so sklonom ku kolapsom.... 20-30

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa rozsahu a stupňa obmedzenia výkonnosti srdcovocievneho systému. Na určenie miery funkčnej poruchy zdravotného postihnutia je menej dôležitý druh ochorenia srdca a obehového ústrojenstva ako rozdielna strata výkonu podľa už prítomného štádia ochorenia.

Pri tepnových uzáveroch na hornej končatine sa určí stupeň funkčnej poruchy tak, že sa porovnáva s inými zdravotnými postihnutiami v tejto oblasti.

Pri veľmi výrazných poruchách - lymfedéme treba brať do úvahy zožyzdenie končatiny.

Pri poruche krvného tlaku sa miera funkčnej poruchy určí po systematickej farmakoterapii.

IX. Dýchacia sústava

1. Chronický zápal priedušiek bez poruchy ventilácie.... 0-10
2. Opakujúce sa zápaly pľúc so spastickou zložkou.... 10-20
3. Chronická astmatická bronchitída so spastickou zložkou, bronchiektázia, emfyzém pľúc, pneumokoniózy, pľúcna fibróza, neaktívna tuberkulóza, stavy po operácii pľúc s trvalým obmedzením pľúcnych funkcií
 - a) ľahký stupeň20
 1. dýchavičnosť, ktorá sa vyskytuje už pri stredne ťažkom zaťažení
 2. stredne ťažká telesná práca
 3. zníženie pľúcnych funkcií o menej ako 50 % príslušných hodnôt
 - b) stredný stupeň30-40
 1. dýchavičnosť, ktorá sa vyskytne už pri každodennom ľahkom zaťažení
 2. ľahká telesná práca
 3. zníženie pľúcnych funkcií až o 50 %
 - c) ťažký stupeň50-70
 1. dýchavičnosť už pri minimálnom zaťažení alebo v pokoji
 2. zníženie pľúcnych funkcií väčšie ako 50 %
4. Bronchiálna astma
 - a) bez trvalého obmedzenia funkcie so sporadickými záchvatmi10
 - b) s trvalým obmedzením pľúcnych funkcií
 1. ľahký stupeň (zníženie pľúcnych funkcií pod 50 %)20
 2. stredný stupeň (zníženie pľúcnych funkcií o 50 %)30-40
 3. ťažký stupeň (zníženie pľúcnych funkcií viac ako 50 %)50-70
5. Zhubné nádory (bronchiálne alebo pľúcne)
 - a) počas chemoterapie, aktinoterapie, chirurgickej liečby80
 - b) neliečiteľné formy100
 - c) stav po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov) s ľahkým obmedzením pľúcnych funkcií40-50
 - d) obmedzenie pľúcnej funkcie stredného až ťažkého stupňa60-80
6. Bronchiálna astma u detí, astmatický syndróm
 - a) ľahká forma20-30
astmatické bronchitídy bez trvalého obmedzenia ventilačnej poruchy pľúc, ktoré trvajú aspoň šesť týždňov v roku
 - b) stredná forma-stredne ťažká perzistujúca30-50
astmatické bronchitídy trvajúce aspoň dva až tri mesiace v roku s trvalou ventilačnou poruchou pľúc ľahkého až stredného stupňa
 - c) ťažká forma50-70
trvalá ventilačná porucha stredne ťažkého až ťažkého stupňa
 - d) trvalá globálna dychová nedostatočnosť s prejavmi dekompenzácie80-90
7. Sarkoidóza
 1. zväčšenie vnútrohruďných uzlín s ľahkým funkčným obmedzením a klinickou symptomatológiou20
 2. postihnutie pľúc s klinickou symptomatológiou20-70
8. Ústna dutina a horné dýchacie cesty
 - a) defekt pier so stálym slinotokom, s poruchou reči a príjmu potravy20-30
 - b) ťažká porucha funkcie jazyka, artikulácie, žuvania s možnosťou prijímať len tekutú stravu50-60
 - c) rozsiahly defekt podnebia s protézou20
 - d) strata podnebia bez možnosti korekcie protézou s poruchou reči a príjmu potravy50-60
 - e) vrodené rászšepy pier, čeľustí, podnebia u detí do dosiahnutia dobrého funkčného stavu orofaciálnej sústavy40-60
 - f) stavy po operáciách rászšepu pier, čeľustí, podnebia u dospelých podľa poruchy reči a prehltania20-30
 - g) izolovaný rászšep pier alebo podnebia20-30
 - h) trvalá tracheostómia (celkový stav, komplikácie)50-60
 - i) obojstranná obrna nervu recurrens s poruchou hlasu30
 - j) poruchy artikulácie a hlasu
 1. ťažko zrozumiteľná reč20-30
 2. nezrozumiteľná reč50-60
 3. ťažká zajakovosť20-30
 - k) iné poruchy priechodnosti dýchacích ciest (podľa ovplyvnenia dýchania a výkonnosti)20-30
9. Chronický zápal prinosových dutín ťažkého stupňa s komplikáciami (hnisavá sekrécia, dráždenie trojklaného nervu, tvorba polypov, vnútrolebkové, očné)20-40

10. Úplná strata čuchu10-20

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa vplyvu vlastnej choroby na celkový stav, pôsobenia a dôsledkov na ostatné orgány. Pri sarkoidóze sa určí podľa rozsahu obmedzenia pľúcnych funkcií.

X. Tráviace ústrojenstvo

A. Ochorenie pažeráka

1. Trakčný divertikul (podľa veľkosti a ťažkosti)0-10

2. Pulzný divertikul

- a) bez podstatnej prekážky pri príjme potravy0-10
- b) so značnou prekážkou pri príjme potravy20-40

3. Funkčná alebo organická stenóza pažeráka

- a) bez podstatnej prekážky pri príjme potravy0-10
- b) s poruchou pri príjme potravy20-30
- c) so značnou poruchou výživy a výkonnosti40-60

4. Malígný nádor pažeráka

- a) po radikálnej a onkologickej liečbe nádoru treba počkať spravidla päť rokov, či bola liečba úspešná.... 40-80
- b) so značným úbytkom výživy a výkonnosti90-100

5. Totálna náhrada pažeráka s poruchou príjmu potravy, s obmedzením výživy a výkonnosti, so zohľadnením zohyžďujúceho pôsobenia70-90

B. Ochorenie žalúdka

1. Chronické, recidivujúce vredy žalúdka a dvanástnika

- a) recidivujúce po dvoch-troch rokoch0-10
- b) s častejšími recidívami ochorenia20-30
- c) s trvalým výrazným znížením výživy a výkonnosti s komplikáciami40-50

2. Totálne odstránenie žalúdka, hodnotí sa vplyv na stav výživy a úbytok výkonnosti, prípadné komplikácie50-80

3. Chronická gastritída (ireverzibilná zmena sliznice žalúdka)

- a) bez podstatných klinických prejavov0-10
- b) s úbytkom výživy a výkonnosti alebo s výraznými komplikáciami20-30

4. Dráždivý žalúdok (funkčná porucha) 0-10

5. Čiastočné odstránenie žalúdka, gastroenteroanastomóza

- a) s dobrou funkciou10-20
- b) s komplikáciami (napr. dumpingový syndróm, ulcus pepticum)30-50

6. Čiastočné alebo úplné odstránenie žalúdka pre malignitu - treba počkať spravidla päť rokov, či bola liečba úspešná
Počas tohto obdobia:

- a) pri čiastočnom odstránení žalúdka vo včasnom štádiu (early cancer - T1-NOMO)40-50
- b) po čiastočnej alebo úplnej resekcii žalúdka pri prebiehajúcom onkologickom liečení.... 80-100
- c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov)40-50
- d) neliečiteľné formy90-100

C. Ochorenie tenkého a hrubého čreva

1. Chronický zápal čriev, divertikulitída, divertikulóza, čiastočné resekcie čreva alebo iné črevné poruchy

- a) bez podstatných klinických prejavov (napr. syndróm dráždivého čreva)0-10
- b) so silnejšími trvalými symptómami (napr. hnačky, spazmy a pod.)20-30
- c) so značným úbytkom hmotnosti a výkonnosti30-50

2. Colitis ulcerosa, idiopatická proktokolitída, Crohnova choroba

- a) s miernym účinkom na celkový stav (hnačky, znížená výkonnosť)10-20
- b) so stredne závažným účinkom na celkový stav (trvalé alebo často recidivujúce zápaly sliznice s krvácaním)30-50
- c) s ťažkým účinkom na celkový stav a výkonnosť (perforácie, opakované operácie, malnutrícia)60-80

3. Črevné malabsorpcie (coeliakia, sprue, malabsorpcia spôsobená intoleranciou)

- a) bez podstatných klinických prejavov pri dietoterapii u dospelých30-50
- b) u detí do skončenia povinnej školskej dochádzky40-60
- c) na liečbu rezistentné pokročilé formy u dospelých so znížením stavu výživy a výkonnosti60-80

4. Po odstránení malígneho tumoru čreva (treba počkať spravidla päť rokov na efekt liečby)

V priebehu tohto obdobia:

- a) po odstránení lokalizovaných črevných nádorov z oblasti tračníka alebo rekta vo včasnom štádiu (T1-NOMO Dukes A) počas onkologickej liečby50-60
- b) s vytvorením trvalej kolostómie70-80
- c) počas onkologickej liečby bez vytvorenia kolostómie60-70
- d) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov)40-50
- e) neliečiteľné formy90-100

5. Stav po odstránení podstatnej časti tenkého alebo hrubého čreva (nenádorové príčiny)30-50

6. Zrasty v brušnej dutine

- a) bez výraznej klinickej symptomatológie0-10

- b) s poruchami pasáže20-30
- c) s častými recidivujúcimi ileóznymi stavmi50-60

7. Hemoroidy

- a) bez výrazných ťažkostí s občasným krvácaním0-10
- b) s častými recidivujúcimi zápalmi, trombotizovaním alebo silnejším krvácaním10-20

8. Vyvrátenie konečníka

- a) malý reponibilný0-10
- b) trvalý s krvácaním20-40

9. Slabosť zvierača riti s občasným odchodom stolice40-60

10. Strata zvierača riti60-80

11. Perianálne píšťaly

- a) nepatrné, bez stálej sekrécie.... 0-10
- b) s častou alebo trvalou sekréciou.... 20-40

12. Umelá riť (kolostómia, ileostómia)

- a) s dobrou možnosťou uzáveru.... 50-60
- b) bez možnosti uzáveru.... 60-80

D. Ochorenie pečene, žlčových ciest, podžalúdkovej žľazy

1. Ochorenia pečene (bez ohľadu na etiológiu)

Funkčná hyperbilirubinémia.... 0-10

2. Chronická perzistujúca hepatitída.... 10-20

3. Chronická agresívna hepatitída - podľa aktivity a funkčnej poruchy

- a) ľahkého stupňa10-20
- b) stredného stupňa20-40
- c) ťažkého stupňa50-90

4. Fibróza pečene

- a) ľahkého stupňa0-10
- b) ťažšieho stupňa10-20

5. Zápalová cirhóza pečene

- a) stacionárna20-30
- b) s miernou aktivitou.... 30-40
- c) s vyššou aktivitou, progredujúca50-70
- d) portálna hypertenzia po skratovej operácii50-70

6. Steatóza pečene, toxické poškodenie pečene

- a) bez mezenchýmových reakcií0-10
- b) steatóza s hepatitídou, chronická toxická hepatitída - ako pri chronickej agresívnej hepatitíde50-90

7. Resekcia pečeňového laloka.... 50-70

8. Malígne nádory pečene, žlčníka, žlčových ciest, podžalúdkovej žľazy

- a) počas onkologickej liečby90-100
- b) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov)40-50
- c) neliečiteľné formy90-100

9. Transplantácia pečene (podľa funkčného nálezu, stavu výživy a výkonnosti)50-90

10. Chronické zápal intrahepatálnych žlčových ciest - hodnotí sa ako pri chronickej agresívnej hepatitíde alebo cirhóze20-80

11. Dyskinéza žlčových ciest sa hodnotí podľa výskytu biliárnych kolík s odstupom viacerých mesiacov....0-10

12. Ochorenia žlčových ciest (litiáza, chronické recidivujúce zápal)

- a) s kolikami s odstupom niekoľkých mesiacov, zápalov s odstupom rokov0-10
- b) s častejšími kolikami a so zápalmi, s intenzívnymi ťažkosťami10-20
- c) s dlhotrvajúcimi zápalmi alebo s komplikáciami20-40

13. Strata žlčníka

- a) so zvyškovými funkčnými poruchami, postcholecystektomický syndróm10-20
- b) pri dlhšie trvajúcich kolikách20-40

14. Chronické ochorenie podžalúdkovej žľazy podľa účinku na celkový zdravotný stav, častot a rozsah bolesti

- a) čiastočné zníženie výkonnosti, slabšia výživa, dyspeptické ťažkosti, hnačky0-10
- b) zreteľné zníženie výkonnosti, oslabenie výživy, častejšie hnačky30-40
- c) výrazné zníženie výživy a výkonnosti, tukové stolice40-60

E. Prietrž

1. Slabinová, skrotálna alebo stehenná prietrž podľa veľkosti a reponibility

- a) jedno- alebo obojstranná bez klinickej symptomatológie0-10

b) pri klinickej symptomatológii (bolesti, obmedzenie pohybu pri záťaži a pod.)10-20

2. Pupočná prietrž alebo prietrž v bielej línii podľa klinickej symptomatológie0-10

3. Prietrž v jazvách po brušnej operácii

- a) bez výraznej symptomatológie podľa veľkosti0-10
- b) so značným obmedzením brušného lisu10-20
- c) pri poruchách pasáže bez značných komplikácií20-30
- d) pri častých recidivujúcich prejavoch ileózných stavov30-40

4. Prietrž bránice

- a) pažeráková sklzná prietrž0-10
- b) iné malé bránicové prietrže bez podstatnej funkčnej poruchy0-10
- c) väčšie bránicové prietrže podľa stupňa funkčnej poruchy (refluxná ezofagitída)10-20
- d) prietrž s rozsiahlym premiestnením brušných orgánov s poruchami pasáže a s vplyvom na kardiopulmonálny systém40-60

5. Hydrokéla a varikokéla0-10

Miera funkčnej poruchy sa pri organických a funkčných ochoreniach zažívacieho ústroja určí podľa stupňa a úbytku výkonnosti, stupňa orgánových porúch a podľa potreby osobitných režimových opatrení. Pri alergicky podmienených ochoreniach má význam zamedzenie pôsobenia alergénov.

Po selektívnej proximálnej vagotómii prichádza hodnotenie miery funkčnej poruchy do úvahy, ak sú prítomné črevné poruchy (hnačky) alebo pretrvávajú účinky základného ochorenia.

Vyvrátenie konečníka, hemoroidy a rektálne píšťaly treba hodnotiť podľa lokality, rozsahu, funkcie zvierača a črevnej steny.

Pri rozsiahlom vyvrátení konečníka, kolostómii, ileostómii a silne secernujúcich sterkorálnych fistúl treba hodnotiť i psychickú ujmu (najmä obmedzenie spoločenského styku, sexuálneho života).

XI. Ochorenie kože

1. Jazvy po popálení alebo poleptaní na ploche

- a) do 40 % kožného krytu10-20
- b) nad 40 % kožného krytu (dekubity)20-40

2. Ekzémy

- a) chronický ekzém (napr. kontaktný ekzém) na viditeľných častiach tela (ťažšieho stupňa)20-30
- b) endogénny ekzém, atopická dermatitída s dlhotrvajúcimi prejavmi generalizovaného charakteru, dermorespiračný syndróm30-50
- c) seboroický ekzém ťažšieho stupňa s postihnutím viditeľných častí tela50-60

3. Acne vulgaris (induratívna forma) s tvorbou vredov so značnou kozmetickou ujmu20-30

4. Acne conglobata s opakovanou tvorbou píšťal, vredov a trvalou premenou tkaniva na jazvy30-40

5. Systémové ochorenia spojivového tkaniva (lupus erythematosus, dermatomyozitída, sklerodermia)

- a) kožné zmeny ohraničené na predilekčných miestach alebo pri väčšom rozšírení, podľa funkčného postihnutia20-30
- b) rozsiahle kožné zmeny, ulcerácie, obmedzenie pohybov v kĺboch, postihnutie vnútorných orgánov.... 40-60

6. Pľuzgierovité kožné ochorenia (napr. pemfigus)

- a) ťažšie postihnutie kože a slizníc30-40
- b) generalizované postihnutie kože a slizníc.... 60-80

7. Psoriasis vulgaris

- a) s výskytom na predilekčných miestach10-20
- b) generalizovaná forma s kĺbovým postihnutím, remisiami trvajúcimi niekoľko mesiacov30-50
- c) generalizovaná ťažká forma postihujúca celý povrch tela bez období zlepšenia50-60

8. Erythrodermia

- a) pri malej intenzite zápalového procesu20-30
- b) pri závažnej intenzite zápalového procesu s ťažkou alteráciou celkového stavu40-50

9. Ichtyóza

- a) stredne ťažká forma dlhodobo postihujúca trup a končatiny20-30
- b) ťažká forma postihujúca celý povrch tela60-80

10. Dermatomykózy

- a) postihnutie nechtových platničiek rúk a nôh, priľahlých častí kože, tiež v intertriginózných priestoroch10-20
- b) systémové mykózy (napr. kandidóza, histoplazmóza, kokcidiomykóza) s rozsiahlymi prejavmi na koži, s postihnutím niekoľkých vnútorných orgánov, systémov s alteráciou celkového stavu40-60

11. Recidivujúci eryzipel podľa stupňa lymfedému alebo obmedzenia pohyblivosti20-30

12. Recidivujúci pásový opar20-30

13. Úplná strata vlasov a ochlpenia30-50

14. Malígne tumory kože (s výnimkou malých bazaliómov)

- a) po odstránení melanómu alebo iných malígnych kožných tumorov v počiatočnom štádiu30-40
- b) v pokročilom štádiu, neliečiteľné formy80-100

c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov)30-40

Miera funkčnej poruchy sa pri kožných ochoreniach určí podľa druhu, rozšírenia, lokality, účinku na celkový stav, sprievodné prejavy ako svrbenie, mokvanie, pálenie, zápach, tvorba jaziev.

XII. Pohybový a podporný aparát

A. Chrbtica, choroby kĺbov, zápalové reumatické ochorenie, iné choroby kostí, chrupiek, šliach, svalov

1. Poruchy chrbtice

- a) zlomeniny tela stavca do 1/4 tela stavca, spondylolistéza I. a II. stupňa, vrodené chyby a deformácie, stavy po operáciách s ľahkou poruchou statiky a dynamiky chrbtice.... 10
- b) degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách, stavy po operáciách s trvalým postihnutím funkcie a častými recidivami dráždenia nervov a svalov, s poruchou svalového korzetu stredného stupňa, so strednou poruchou dynamiky a statiky chrbtice20-30
- c) ostatné postihnutia chrbtice s ťažkým stupňom poruchy funkcie (napr. skoliózy II. až IV. stupňa), s výraznou deformitou hrudníka s prihliadnutím na stupeň kardiopulmonálnej insuficiencie chronického charakteru, spondylolistézy III. a IV. stupňa, primárna diseminovaná hyperostóza s ankylózou vo viacerých segmentoch chrbtice40-60
- d) stavy po operácii chrbtice a medzistavcových platničiek, rozsiahle degeneratívne zmeny III. a IV. stupňa s ťažkými poruchami funkcie (recidivujúcimi chronickými iritáciami nervov až radikulopatiami s motorickým deficitom na periférii trvalého charakteru, insuficiencia svalového korzetu)30-50

2. Scheurmannova choroba s trvalou staticko-dynamickou poruchou funkcie

Scheurmannova choroba sa hodnotí po 18. roku života

- a) ľahký stupeň poruchy funkcie s chronickou vertebralgiou0-10
- b) stredný a ťažký stupeň poruchy funkcie s nosením korzetu20-30

3. Spondylartritída ankylozujúca - Bechtereva choroba

- a) stredne ťažká forma (III. a IV. stupeň)20-40
- b) ťažké formy (V. stupeň)40-60
- c) ťažký stupeň postihnutia chrbtice s ankylózou bedrových kĺbov70-100

4. Artropatie, zápalové reumatické ochorenia, iné choroby kostí, chrupiek, vnútornej výstelky kĺbu a šliach (chondropatie, synovitídy, tendovaginitídy, entezopatie atď.)

- a) ľahké formy, zriedkavo recidivujúce, s trvalou poruchou funkcie postihnutého kĺbu alebo iných anatomických štruktúr pri trvalom postihnutí výkonu práce horných končatín a dolných končatín10-20
- b) stredne ťažké formy, občas recidivujúce, so strednou poruchou funkcie, ktorá trvale obmedzuje výkonnosť organizmu20-30
- c) ťažké formy, liečebne neovplyviteľné, trvale aktívne s progresiou, s výraznými deštruktívnymi zmenami, s ťažkou poruchou funkcie, ktorá postihuje viac kĺbov horných končatín, dolných končatín a chrbtice, ťažké deformity s ťažkou poruchou pohyblivosti s polytopnou lokalizáciou a orgánovým postihnutím50-70

5. Osteoporóza, osteomalácia, osteopatia

- a) ľahká forma lokálna alebo generalizovaná10-20
- b) ťažká forma so zvýšenou lomivosťou kostí s výrazným obmedzením pohyblivosti a výskytom viacerých kompresívnych zlomenín tela stavca30-60

6. Chronická osteomyelitída

- a) ľahký stupeň - lokalizovaná nepatrná aktivita, drobné hnisanie vo fistule20-30
- b) stredný stupeň, rozsiahlejší proces, častá alebo trvalá sekrécia z fistuly s obmedzením pohyblivosti s prihliadnutím na dominantnosť hornej končatiny a pri dolnej končatine, ak ide o lokalizáciu na váhonosných kĺboch alebo na chodidle30-40
- c) ťažký stupeň - časté ťažké ataky, s horúčkou, vysokou FW, zreteľná infiltrácia mäkkých častí, sekrécia z fistuly a vylučovania sekvesterov, ťažký stupeň obmedzenia pohyblivosti a výkonnosti (opakovaný neúspech konzervatívnej aj operatívnej liečby)50-70

7. Stavy po zlomenine rebier (iba sériové zlomeniny rebier)

- a) ľahký stupeň obmedzenia ventilácie20
- b) stredný stupeň obmedzenia ventilácie30-40
- c) ťažký stupeň obmedzenia ventilácie50-70

8. Stavy po úrazoch panvy

- a) ľahká porucha obmedzujúca len dlhodobé státie a chôdzu10-20
- b) stredne ťažká porucha s porušením statiky a dynamiky dolných končatín a driekovej chrbtice30-40
- c) ťažké poruchy hybnosti dolných končatín, porucha funkcie zvieračov50-80

9. Malígne nádory svalov, kostí a kĺbov

- a) stavy po operácii pri prebiehajúcom onkologickom liečení80
- b) stavy po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov liečby) 40
- c) neliečiteľné formy90-100

10. Malý vzrast, telesná výška po skončení rastu

- a) do 120 cm50
- b) do 130 cm40
- c) do 140 cm30

11. Svalové ochorenia

1. myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie (Duchenneov, Beckerov typ a pod.), zápalové myozitídy, polyomyozitídy a pod., metabolické a endokrinné

- a) ľahšia forma s obmedzením hýbavosti30-50
- b) stredná forma s výrazným obmedzením hýbavosti60-80
- c) ťažká forma (imobilita)80-100

2. myasténia gravis, myastenický syndróm
 - a) ľahké formy20
 - b) stredne ťažké formy s obmedzením hýbavosti40-60
 - c) ťažké formy s výrazným obmedzením hýbavosti60-80

12. Poúrazové svalové ochorenia
 - a) ľahká forma (napr. odtrhnutie dlhej hlavy dvojhlavového svalu)0-10
 - b) stredne ťažká forma s funkčným obmedzením20-30
 - c) ťažká forma s výrazným funkčným obmedzením40-50
(pri dominantnej končatine + 10 %)

B. Postihnutie končatín

B.1. Horné končatiny

1. Strata oboch horných končatín100
2. Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej končatiny100
3. Strata jednej hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo s veľmi krátkym kýpťom (ramena) 60
(pri dominantnej končatine + 10 %)
4. Strata jednej hornej končatiny v ramene alebo v lakťovom kĺbe50
(pri dominantnej končatine + 10 %)
5. Strata jednej hornej končatiny v predlaktí50
(pri dominantnej končatine + 10 %)
6. Strata jednej ruky (celej)50
(pri dominantnej končatine + 10 %)
7. Strata všetkých piatich prstov jednej ruky alebo iná strata úchopovej schopnosti jednej ruky
 - a) ľahký stupeň20-30
 - b) ťažký stupeň40-50
(pri dominantnej končatine + 10 %)
8. Strata všetkých desiatich prstov na rukách70-80
9. Strata jednotlivých prstov na ruke
 - a) strata jedného palca25
 - b) strata dvoch palcov40
 - c) strata ukazováka, prostredníka, prstenníka10
 - d) strata malíčka0
 - e) strata prvého a druhého prsta, prvého a tretieho prsta, prvého a štvrtého prsta30
 - f) strata druhého a tretieho prsta, druhého a štvrtého prsta30
 - g) strata prvého a piateho prsta, druhého a štvrtého prsta25
 - h) strata tretieho a štvrtého prsta, tretieho a piateho prsta25
 - i) strata štvrtého a piateho prsta20
 - j) strata troch prstov s palcom40
 - k) strata štyroch prstov s palcom.... 50
 - l) strata štyroch prstov (palec zachovaný)40
 - m) strata druhého až piateho prsta na oboch rukách80
10. Stuhnutie ramenného kĺbu v priaznivej polohe pri pohyblivom ramennom kĺbe10-20
(pri dominantnej končatine + 10 %)
11. Stuhnutie v ramennom kĺbe v nepriaznivom postavení alebo v porušenej pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa20-30
(pri dominantnej končatine + 10 %)
12. Obmedzenie pohyblivosti jedného ramenného kĺbu
 - a) ľahkého stupňa (elevácie do 120o, primerané obmedzenie rotácie, vystretie, ohnutie)0-10
 - b) stredného stupňa (elevácie do 90o, primerané obmedzenie rotácie, vystretie, ohnutie)10-20
(pri dominantnej končatine + 10 %)
13. Obmedzenie pohyblivosti oboch ramenných kĺbov
 - a) ľahkého stupňa20
 - b) stredného stupňa30
 - c) ťažkého stupňa40
14. Instabilita ramenného pletenca
 - a) ľahkého stupňa (subluxácie)10
 - b) stredného stupňa (zriedkavé luxácie)20-30
 - c) ťažkého stupňa (časté luxácie)40
(pri dominantnej končatine + 10 %)
15. Pseudoartróza kľúčnej kosti10
16. Pseudoartróza ramennej kosti
 - a) stabilná30
 - b) instabilná50

17. Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu

- a) ľahkého stupňa (vystretie/ohnutie 0o- 30o- 120o)0-10
- b) ťažšieho stupňa (najmä ohnutie vrátane obmedzenia rotácie predlaktia)20-30
(pri dominantnej končatine + 10 %)

18. Stuhnutie laktového kĺbu

- a) v priaznivom postavení10-20
- b) v nepriaznivom postavení30-40
(pri dominantnej končatine + 10 %)

19. Pseudoartróza vretennej a laktovej kosti

- a) stabilná10-20
- b) instabilná20-30

20. Stav po zlomenine vretennej kosti a laktovej kosti zhojenej s dislokáciou a funkčnou poruchou susedných kĺbov

- a) ľahký stupeň.... 20
- b) stredný stupeň30
- c) ťažký stupeň40

(pri dominantnej končatine + 10 %)

21. Obmedzenie pohyblivosti zápästia

- a) ľahkého stupňa (vystretie/ohnutie 30o - 0o - 40o) 0-10
- b) ťažšieho stupňa (vystretie/ohnutie)20-30
(pri dominantnej končatine + 10 %)

22. Stuhnutie zápästia

- a) v priaznivom postavení (ľahká dorzálna extenzia možná)10
- b) v nepriaznivom postavení20
(pri dominantnej končatine + 10 %)

23. Stav po zlomenine zápästných kostí alebo po zlomenine jednej záprstnej kosti a viacerých záprstných kostí s poruchou funkcie ruky

- a) ľahký stupeň0-10
- b) stredný stupeň20
- c) ťažký stupeň30

24. Poúrazové aseptické nekrózy zápästných kostí (aktívne štádium dva roky)20-30

25. Nervové poškodenie hornej končatiny

- a) plexus brachialis
- 1. poškodenie hornej časti20-40
- 2. poškodenie dolnej časti30-50
(pri dominantnej končatine + 10 %)
- b) nervus axillaris30
- c) nervus radialis20-30
- d) nervus ulnaris20-30
- e) nervus medianus
- 1. poškodenie hornej časti40
- 2. poškodenie dolnej časti30
- f) nervus radialis a nervus axillaris40-50
- g) nervus radialis a nervus ulnaris40-50
- h) nervus radialis a nervus medianus40-50
- i) nervus ulnaris a nervus medianus.... 40-50
- j) nervus radialis, nervus ulnaris a nervus medianus v oblasti predlaktia40-60
(pri dominantnej končatine + 10 %)

B.2. Dolné končatiny

1. Strata oboch dolných končatín v stehne....100

2. Strata jednej dolnej končatiny v stehne a jednej dolnej končatiny v predkolení s krátkymi amputačnými kýpťami s výrazne zníženou funkciou amputovaného kýpťa80-90

3. Úplná strata jednej dolnej končatiny a jednej hornej končatiny100

4. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo s veľmi krátkym amputačným kýpťom70-80

5. Strata jednej dolnej končatiny v stehne po kolenný kĺb50-60

6. Strata jednej dolnej končatiny v predkolení s dostatočnou funkciou kýpťa a kĺbu 50

7. Strata oboch dolných končatín v predkolení

- a) dobrá funkčnosť amputačných kýpťov60
- b) oslabená funkčnosť amputačných kýpťov.... 70

8. Strata nohy v členkovom kĺbe s dobrou alebo s oslabenou funkciou amputačného kýpťa

- a) jednostranná 30-50
- b) obojstranná 40-50

9. Strata nohy v Chopartovom kĺbe s dobrou alebo s oslabenou funkciou amputačného kýpťa

- a) jednostranná s dobrým kýpťom 20-30
b) obojstranná 40-50.
10. Strata nohy v Lisfrancovom kĺbe alebo v oblasti metatarzov s dobrou alebo oslabenou funkciou amputačného kýpťa
a) jednostranná s dobrým kýpťom10-20
b) obojstranná30-40
11. Strata všetkých prstov na jednej nohe20
12. Strata všetkých prstov na oboch nohách30
13. Stuhnutie oboch bedrových kĺbov
a) v priaznivom postavení.... 60
b) v nepriaznivom postavení.... 70-80
14. Stuhnutie jedného bedrového kĺbu
a) v priaznivom postavení30
b) v nepriaznivom postavení.... 60-70
15. Obmedzenie pohyblivosti bedrových kĺbov
a) ľahký stupeň (vystretie/ohnutie s primeranou rotáciou, prinožením, unožením 0o - 10o - 90o)
aa) jednostranne0-10
ab) obojstranne10-20
b) stredný stupeň (vystretie/ohnutie s primeranou rotáciou, prinožením, unožením 0o - 30o - 90o)
ba) jednostranné20-30
bb) obojstranné30-40
c) ťažký stupeň
1. jednostranné30-40
2. obojstranné40-50
16. Vrodená luxácia bedrových kĺbov počas liečby podľa stupňa kĺbovej chyby (subluxácia-luxácia) a náročnosti použitej liečby
....30-60
17. Stav po operácii bedrového kĺbu s reziduálnou poruchou funkcie
a) ľahký stupeň10-20
b) stredný stupeň20-30
c) ťažký stupeň40-50
(pri obojstrannom postihnutí + 10 %)
18. Stav po vykonanej endoprotéze bedrového kĺbu alebo kolenného kĺbu
a) jednostranná20
b) obojstranná50
19. Pseudoartróza krčka stehennej kosti
a) stabilná30
b) instabilná50
20. Pseudoartróza stehennej kosti
a) stabilná30
b) instabilná50
21. Skrátene dolnej končatiny
a) od 4 cm do 6 cm20
b) nad 6 cm30
c) nad 10 cm40-50
22. Aseptická nekróza
Perthesova choroba v aktívnom štádiu počas liečenia (v rozsahu do dvoch rokov)70-100
23. Stuhnutie jedného kolenného kĺbu
a) v priaznivom postavení (ohnutie o 5o -10o)20-30
b) v nepriaznivom postavení40-50
24. Stuhnutie oboch kolenných kĺbov
a) v priaznivom postavení50
b) v nepriaznivom postavení.... 60
25. Uvoľnenie väzivového aparátu kolena, luxácie10-20
26. Stav po zlomenine jabĺčka
a) bez dislokácie úlomkov s opakovanou liečbou....10
b) s dislokáciou úlomkov20-30
27. Obmedzenie funkcie v kolennom kĺbe (vystretie/ohnutie)
a) ľahký stupeň (vystretie/ohnutie 0o - 0o - 90o)
aa) jednostranne0-10
ab) obojstranne10-20
b) stredný stupeň (vystretie/ohnutie 0o - 10o - 90o)
ba) jednostranne20-30
bb) obojstranne30-40
c) ťažký stupeň (vystretie/ohnutie 0o - 30o - 90o)

- ca) jednostranne.... 30-40
- cb) obojstranne40-50

28. Pseudoartróza kostí predkolenia

- a) stabilná20-30
- b) instabilná40-50

29. Stuhnútie horného členkového kĺbu

- a) v priaznivom postavení (plantárna flexia od 5 do 15 stupňov)20
- b) v nepriaznivom postavení (plantárna flexia nad 15 stupňov)30

30. Stuhnútie dolného členkového kĺbu (v strednom postavení)10

31. Stuhnútie horného členkového kĺbu aj dolného členkového kĺbu

- a) v priaznivom postavení30
- b) v nepriaznivom postavení.... 40

32. Obmedzenie funkcie členkového kĺbu (vystretie/ohnutie, vbočenie chodidla)

- a) ľahký stupeň0-10
- b) stredný stupeň (0o - 0o - 30o)10-20
- c) ťažký stupeň20-30

33. Pes equinovarus vrodený (stupeň funkčnej poruchy závisí od rozsahu deformity nohy, frekvencie a intezity bolesti, od schopnosti či neschopnosti stáť a chodiť bez ortopedických topánok)

- a) jednostranný20-40
- b) obojstranný30-60

34. Ostatné deformity nohy s poruchou statiky a dynamiky nohy pri stoji a pri chôdzi stredného a ťažšieho stupňa podľa závislosti od trvalého nosenia ortopedických topánok a potreby liečby bolesti nohy20-60

35. Nervové výpady dolných končatín

- a) plexus lumbosacralis80
- b) nervus superior20
- c) nervus inferior20
- d) nervus femoralis40
- e) nervus cutaneus femoralis10
- f) nervus ischiadicus
 - 1. proximálna časť60
 - 2. distálna časť50
- g) nervus peroneus communis (nervus fibularis)
 - 1. profundus30
 - 2. superficialis20
- h) nervus tibialis30

36. Úplná afunkčnosť jednej dolnej končatiny 80

Miera funkčnej poruchy sa určí podľa následkov zdravotného postihnutia straty dolnej končatiny (anatomická alebo funkčná) a bez ohľadu na kompenzáciu týchto následkov ortopedickými pomôckami. Pri nervových postihnutiach dolnej končatiny sa posudzuje úplný nervový výpad. Čiastočný nervový výpad sa určuje polovicou príslušnej miery funkčnej poruchy. Izolované senzitivne nervové výpady sa neposudzujú.

Miera funkčnej poruchy sa určí v závislosti od rozsahu funkčných porúch, rtg. zmien v zmysle degeneratívnych zmien a dosiaľ vykonanej liečby.

Miera funkčnej poruchy sa určí podľa následkov zdravotného postihnutia straty hornej končatiny (anatomická alebo funkčná) s prihliadnutím na dominantnosť hornej končatiny a bez ohľadu na kompenzáciu týchto následkov ortopedickými pomôckami.

Pri strate všetkých desiatich prstov sa posudzuje strata celých prstov; neposudzujú sa strata jednotlivých článkov prstov.

Pri nervových postihnutiach hornej končatiny sa posudzuje úplný nervový výpad pri intenzívnej liečbe (jeden rok). Čiastočný nervový výpad sa určuje polovicou príslušnej miery funkčnej poruchy. Izolované senzitivne nervové výpady sa neposudzujú.

XIII. Močové ústrojenstvo

A. Postihnutie obličiek

1. Strata alebo výpad funkcie obličky pri zdravej druhej obličke10-20

2. Vývojová anomália obličiek bez podstatných ťažkostí a bez funkčného obmedzenia0-10

3. Nefrolitiáza bez funkčného obmedzenia

- a) s kolikami s odstupom niekoľkých mesiacov0-10
- b) s častejšími kolikami a ťažkosťami10-20

4. Postihnutie obličiek s obmedzením funkcie (bez ohľadu na etiológiu)

- a) ľahkého stupňa (obličkové funkcie sú trvale znížené s miernym obmedzením výkonnosti)20-40
- b) stredného stupňa (obličkové funkcie sú značne znížené so značným obmedzením výkonnosti) 40-60
- c) ťažkého stupňa (sú prítomné laboratórne známky chronickej obličkovej insuficiencie s podstatným obmedzením výkonnosti)60-80

5. Strata alebo výpad jednej obličky s funkčným obmedzením druhej obličky

- a) ľahkého stupňa

1. bez progresie20-30
 2. s progresiou30-40
 - b) stredného stupňa40-60
 - c) ťažkého stupňa60-80
6. Postihnutie obličiek liečených umelou obličkou (dialýzou) s ohľadom na prítomné komplikácie60-80
7. Transplantácia obličky
- a) stav po transplantácii obličky do dvoch rokov80-100
 - b) stav po transplantácii obličky s dobrou funkciou štepu po dvoch rokoch50-60
8. Malígný tumor obličky
- a) po odstránení vo včasnom štádiu (T1 NOMO)40-50
 - b) po odstránení v iných štádiách70-90
 - c) po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov)40-50
 - d) neliečiteľné formy90-100

B. Ochorenie močových ciest

1. Chronický zápal močových ciest
 - a) ľahšieho stupňa (bez podstatnej poruchy mikcie)0-10
 - b) ťažšieho stupňa (so značnými poruchami mikcie)10-20
2. Poruchy vyprázdňovania močového mechúra
- a) ľahšieho stupňa (pri nepatrnej retencii moču, nočné odkvapkávanie moču)10
 - b) ťažšieho stupňa (potrebné manuálne vyprázdňovanie, použitie močového stimulátora, značná retencia moču (nad 100 ml), bolestivé močenie20-30
 - c) s potrebou pravidelného cievkovania, trvalé nosenie cievky, urinálu, bez podstatných sprievodných prejavov40-50
3. Malígný tumor močového mechúra (povrchový a infiltratívny)
- a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1-2 NOMO)40-60
 - b) po odstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby80-90
 - c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov)40-50
 - d) neliečiteľné formy 90-100
4. Inkontinencia moču
- a) relatívna inkontinencia moču
 1. stresová I. stupňa0-10
 2. stresová II. stupňa20-30
 3. stresová III. stupňa40-50 - b) úplná inkontinencia moču.... 50-70
5. Zvráskavený mechúr so značným zmenšením kapacity20-40
6. Močovo-dno-kožná píšťala prednej močovej trubice pri inkontinencii moču20
7. Močovo-črevná píšťala pri análnej inkontinencii40-60
8. Obličkovo-kožná píšťala, močovo-dno-kožná píšťala a mechúrovo-kožná píšťala so značnou sekréciou60-70
9. Umelý vývod moču navonok60-80
10. Funkčne málo významné anomálie močovo-pohlavného systému10-20
11. Anomálie so stredne ťažkým postihnutím až ťažkým postihnutím funkcie a telesnej výkonnosti40-60
12. Vrodené chyby močovo-pohlavného systému s anomálnym vyústením, rázštepové chyby u detí40-60

Stupeň postihnutia sa určí podľa rozsahu funkčnej poruchy do obdobia rekonštrukčného riešenia.

Miera funkčnej poruchy zdravotného postihnutia močového ústrojenstva sa určí poruchou produkcie moču (overí sa najmä funkčným vyšetrením, lekáorskými nálezmi, urodynamickým vyšetrením, endoskopicky). Treba brať do úvahy aj zdravotné postihnutie iných orgánov (najmä srdca a obehu), aktivitu zápalového procesu, účinky na celkový stav a potrebu obmedzenia spôsobu života. Miera funkčnej poruchy pri zdravotných postihnutiach uvedených v písmene B bode šesť až dvanásť sa určuje len do obdobia rekonštrukčného riešenia.

XIV. Pohlavné orgány

A. Mužské pohlavné orgány

1. Strata penisu....40-50
2. Čiastočná strata penisu.... 20-40
3. Malígný tumor penisu

 - a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1-2 NOMO)40-50
 - b) po odstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby80-90
 - c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov)40-50
 - d) neliečiteľné formy90-100

4. Strata oboch semenníkov alebo úplná atrofia oboch semenníkov

 - a) pred skončením telesného vývoja20-40

- b) v produktívnom veku20-30
- c) vo vyššom veku10

5. Malígný tumor semenníka

- a) po odstránení lokalizovaného seminómu alebo lokalizovaného malígneho teratómu bez postihnutia lymfatických uzlín (T1 NOMO)40-50
- b) v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby70-80
- c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov)40-50
- d) neliečiteľné formy90-100

6. Chronické zápaly prostaty s trvalými značnými poruchami mikcie10-20

7. Adenóm prostaty bez porúch mikcie alebo s ľahkou poruchou0-10

8. Malígný tumor prostaty

- a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1-2 NOMO)40-50
- b) po odstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby80-90
- c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov)40-50
- d) neliečiteľné formy90-100

9. Malígný tumor prsnej žľazy

- a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1 NOMO)40-60
- b) po odstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby80-90
- c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov)40-50
- d) neliečiteľné formy90-100

10. Vrodené chyby pohlavných orgánov40-60

B. Ženské pohlavné orgány

1. Strata prsníka nenádorovej etiológie (vo fertilnom veku)

- a) jednostranná30
- b) obojstranná50

2. Strata atrofického prsníka po menopauze

- a) jednostranná.... 10-20
- b) obojstranná20-30

3. Hypertrofia prsníkov (pubertálna forma, mastoptóza)10-20

4. Malígný tumor prsnej žľazy

- a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1 NOMO)40-60
- b) po odstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby.... 80-90
- c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov)40-50
- d) neliečiteľné formy90-100

5. Strata maternice alebo sterilita vo fertilnom veku10-20
(treba prihliadať na psychoreaktívne poruchy)

6. Malígný tumor krčka maternice a tela maternice (s výnimkou carcinoma in situ)

- a) po odstránení tumoru krčka maternice alebo tela maternice v štádiu Ia, Ib (T1 NOMO)40-50
- b) po odstránení tumoru v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby80-90
- c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov)40-50
- d) neliečiteľné formy90-100

7. Strata oboch vaječníkov bez výrazného patologického účinku na hormonálny systém0-10

8. Strata oboch vaječníkov vo fertilnom veku alebo pri nedostatočnej možnosti substitúcie pri vyrovnaní hormonálneho deficitu20-30

9. Malígný tumor vaječníka

- a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1 NOMO)40-50
- b) v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby80-90
- c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov) 40-50
- d) neliečiteľné formy90-100

10. Chronický alebo často sa opakujúci zápal vaječníkov, závesného aparátu maternice alebo maternice

- a) ľahkého stupňa0-10
- b) stredného stupňa10-20
- c) ťažkého stupňa (recidívy viackrát v roku)20-30

11. Endometrióza ťažkého stupňa20-30

12. Vaginálne píšťaly

- a) píšťala močová cesta - pošva.... 40-60
- b) píšťala konečník - pošva40-60
- c) píšťala močová cesta - konečník - pošva80-90
- d) filiformné píšťaly20-30

13. Pokles pošvovej steny alebo maternice

- a) bez močovej inkontinencie alebo s nepatrnou stresovou inkontinenciou moču (I. stupeň)0-10
- b) so silnejšou inkontinenciou moču20-40

c) s úplnou inkontinenciou moču50-60

14. Vrodené chyby pohlavných orgánov.... 40-60

15. Craurosis vulvae

a) ľahkého stupňa bez ťažkostí alebo s minimálnymi ťažkosťami0-10

b) ťažšieho stupňa so značnými ťažkosťami, sekundárne zmeny (vredy, ekzémy, jazvy)20-40

16. Malígny tumor pošvy a vonkajších rodidiel (s výnimkou carcinoma in situ)

a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1 NOMO)40-50

b) v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby80-90

c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov)40-50

d) neliečiteľné formy90-100

Miera funkčnej poruchy zdravotných postihnutí sa určí na základe klinického obrazu v urologickej, sexuálnej a onkologickej oblasti. Pri zdravotných postihnutiach ženských pohlavných orgánov sa miera funkčnej poruchy určí na základe gynekologického, endokrinologického a onkologického vyšetrenia s prihliadnutím na vek ženy. Pri vrodených poruchách pohlavných orgánov sa miera funkčnej poruchy určí len do obdobia rekonštrukčného riešenia.

XV. Hlava a tvár

1. Stavby po traume (úraze) hlavy a mozgu s vnútrolebkovým krvácaním, s trvalými poruchami v neurologickej, psychiatrickej, psychologickkej a zmyslovej oblasti

a) poruchy ľahkého stupňa20-30

b) poruchy stredného stupňa40-60

c) poruchy ťažkého stupňa70-100

2. Stavby po zlomeninách lebky bez neurologických príznakov, stavby po otrase mozgu5-10

3. Zohyzďujúce znetvorenie tváre, ťažké deformity kostných a mäkkých častí ovplyvňujúcich mimiku, artikuláciu, žuvanie a pod.30-60

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa klinickej symptomatológie v neurologickej, stomatologickej, oftalmologickej a estetickej oblasti.